

Actualité de saison 3

**Prairies temporaires après la canicule :
évaluer avant d'agir !**



Zoom sur l'avenir des prairies souffrant de la canicule

Les épisodes de fortes chaleurs et le déficit hydrique de cet été ont fortement marqué les prairies temporaires. Selon les régions et de nombreux facteurs, certaines parcelles ont relativement bien résisté, tandis que d'autres présentent aujourd'hui des dégâts importants.

Avant d'intervenir, il est essentiel de réaliser un diagnostic précis. Un sursemis n'est pas toujours la meilleure solution et, dans certains cas, un renouvellement complet, voire une modification de la rotation culturale, peut s'avérer plus judicieux.

Pourquoi la prairie s'est-elle dégradée ?

La sécheresse agit comme un véritable filtre naturel. Les espèces les plus sensibles, notamment **les ray-grass, disparaissent progressivement** lorsque le stress hydrique se prolonge. Les légumineuses peuvent également être fortement touchées.

Les espaces laissés libres sont rapidement colonisés par des espèces moins intéressantes, les espèces dites bouchent-trous, notamment le pâturin annuel, les pissenlits et le rumex. Outre la perte de rendement cette année, **la perte pourrait être aussi élevé lors de la prochaine saison**. En effet, Une prairie déséquilibrée produit généralement moins de fourrage et aussi de moindre qualité.



Avant toute intervention : poser le bon diagnostic

Quelques observations permettent déjà d'orienter la décision :

- Quelle proportion de bonnes espèces reste présente ?
- Les zones dégarnies représentent-elles moins de 20 %, entre 20 et 40 % ou davantage ?
- Les adventices sont-elles en progression ?
- La prairie approche-t-elle de la fin de sa durée de vie prévue ?

Ces éléments permettront de choisir la stratégie la plus rentable.

Deux stratégies possibles

1. Le sursemis

À privilégier lorsque :

- ✓ la prairie conserve encore une bonne densité ;
- ✓ les espèces semées restent majoritaires ;
- ✓ les dégâts sont localisés.

Le sursemis permet de redensifier rapidement la prairie tout en limitant les coûts



2. Repenser la rotation

Une prairie fortement dégradée peut aussi être l'occasion de revoir l'assolement.

Plutôt que de réimplanter immédiatement une prairie, il peut être pertinent d'introduire une culture, par exemple :

- céréale d'automne ;
- méteil ;
- maïs selon les conditions ;
- autre culture adaptée à l'exploitation.

État de la prairie	Décision recommandée
Plus de 80 % de bonnes espèces	Conserver ou léger sursemis
50 à 80 % de bonnes espèces	Sursemis avec mélange adapté
Moins de 50 % de bonnes espèces	Renouvellement complet
Prairie en fin de cycle ou forte pression d'adventices	Envisager une culture dans la rotation avant de réimplanter une prairie

L'automne : une période clé pour réussir l'implantation

Le retour des précipitations et des températures plus modérées offre généralement des conditions idéales pour le sursemis ou le renouvellement des prairies. Une intervention précoce permet aux jeunes plantules de bien s'implanter avant l'hiver et d'assurer une reprise vigoureuse au printemps.

Pour optimiser la réussite d

e l'implantation :

- Intervenir dès que l'humidité du sol est suffisante ;
- Limiter la concurrence de la végétation en place par une coupe ou un pâturage préalable ;
- Assurer un bon contact entre la graine et le sol ;
- Adapter le mélange au mode d'exploitation et aux conditions de la parcelle ;

Profiter des meilleures conditions d'automne

Le retour des pluies et des températures plus fraîches offre des conditions idéales pour le sursemis ou le renouvellement des prairies.

Une intervention précoce permet une implantation réussie avant l'hiver.





Promotion des mélanges sursemis

Orga-mix S (disponible en bio)

Composition (en %) :

Ray-grass Westerwold 20 % – Ray-grass italien 4n 60 % – Ray-grass hybride 20%

Utilisation : Prolonger d'une à deux années la durée d'utilisation des prairies artificielles riche en trèfle.

Avantages : Croissance rapide, économiquement intéressant.

Densité : 20 à 35 kg/ha

Prix : 6.40/kg : **Rabais spécial de 10% pour une commande jusqu'au 21 août**

Orga-mix S + TV longue durée avec bactolive



Composition (en %) :

Ray-grass Westerwold mono-coupe 18 % – Ray-grass italien 54 % – Ray-grass hybride 18% - Trèfle violet longue durée 2n 10%

Utilisation : Prolonger de deux années la durée d'utilisation des prairies artificielles avec du ray-grass et du trèfle productif.

Avantages : **Mélange à façon** enrobé avec **bactolive**. Les micro-organismes **vont favoriser la germination, la croissance des racines et des plantules** et va favoriser le développement du mycorhize du sol. Souvent utilisé pour les terrains de foot.

Densité : 20–35 kg/ha

Prix : 7.10/kg : **Rabais spécial de 10% pour une commande jusqu'au 21 août**

Média 24 Plus (disponible en bio)

Composition (en %) :

Trèfle violet 4n 15% – Trèfle Violet longue durée 4n 10% – Trèfle blanc 10% – Ray-grass italien 2n 20% – Ray-grass italien 4n 20% – Ray-grass hybride 4n 25%

Utilisation : Prolonger d'une à deux années la durée d'utilisation. Pour exploitation à haute performance

Avantages : Riche en légumineuse et très productif

Densité : 20–35 kg/ha

Prix : 10.30/kg : **Rabais spécial de 10% pour une commande jusqu'au 21 août**

Promotion des mélanges sursemis

U-Raigras AR (disponible en bio)

Composition (en %) : 3 variétés différentes de ray-grass anglais

Utilisation : Sursemis pour prairies permanentes et pâturages

Densité : 20kg/ha

Prix : 6.90/kg : **Rabais spécial de 10% pour une commande jusqu'au 21 août**

U-Secco AR

Composition (en %) : Trèfle blanc 10% – Ray-grass anglais 15% – Dactyle 25% – Fétuque rouge 10% – Fétuque élevée 15% – Pâturin des prés 25%

Utilisation : Sursemis pour prairies permanentes en améliorant la résistance à la sécheresse

Densité : 20kg/ha

Prix : 10.-/kg : **Rabais spécial de 10% pour une commande jusqu'au 21 août**

